

AFTATOPIC

SOLUCIÓN

COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contiene:

Extracto de Rheum.....5g

Ácido Salicílico..... 1 g

Excipientes (alcohol diluido), c.s.

USO TRADICIONAL RECOMENDADO

Coadyuvante en el tratamiento de lesiones inflamatorias limitadas a la mucosa bucal y en el tratamiento local de las aftas.

CONTRAINDICACIONES

La utilización de este medicamento esta contraindicada en los siguientes casos:

El uso del producto esta contraindicado en niños menores de 6 años

Acido Salicílico:

- Antecedentes de hipersensibilidad a los medicamentos que contienen salicilatos (en particular en ácido salicílico)

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

Este producto contiene alcohol en una concentración del 60 % v/v .

No exceder de 7 días de uso, si no hay mejoría consultar con su médico.

En el embarazo y lactancia usar con precaución, se recomienda consultar con su médico previamente.

Luego de usar, cerrar el frasco. El uso de AFTATOPIC es personalizado.

Mantener fuera del alcance de los niños.

INTERACCIONES

No se han reportado, sin embargo, no se recomienda el uso concomitante de productos para aplicación tópica a nivel bucal y gingival por posibles interacciones.

REACCIONES ADVERSAS

Es común una ligera sensación de ardor local transitoria en el lugar de la aplicación, se puede sentir una ligera sensación de hormigueo por la presencia de alcohol. En razón de la presencia de ácido salicílico, el producto podría causar reacciones de hipersensibilidad, como reacciones alérgicas que incluyen rash y urticaria.

Posible coloración amarillenta de los dientes que es reversible con la suspensión del uso del producto.

INCOMPATIBILIDADES

No aplica

DOSIFICACIÓN Y VIA DE ADMINISTRACIÓN RESERVADO PARA ADULTOS Y NIÑOS MAYORES DE 6 AÑOS DEBIDO AL FUERTE CONTENIDO DE ALCOHOL

VÍA Tópica

No tragar

La posología usual es de 2 a 4 aplicaciones por día, especialmente antes de acostarse, pudiendo ser el tratamiento de 2 hasta 7 días.

Aplicar sobre la lesión con una paleta (que se adjunta a la botella) o con un palillo de algodón.

No enjuagar los dientes o la boca inmediatamente después de la aplicación.

SOBREDOSIS

No se han descrito con el uso y dosis recomendadas. Una sobredosis asociada a una aplicación local es poco probable, debido a que es la absorción sistémica de ácido salicílico y derivados antraquinónicos es muy poco probable. En caso de una sobredosis accidental el tratamiento debe ser sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar una temperatura inferior a 30 °C

PRESENTACIONES

Caja con frasco y aplicador tipo paleta x 5, 10 y 15 mL.

Fabricado por Arbofarma S.A.S - Colombia

Para:

Representaciones Sanimed S.A.C.

Av. Mariscal la Mar N° 750 Int. 512, Miraflores,

Lima – Perú

RUC: 20606089440

Web page: www.sanimedperu.com

+511 4572289